

Regional-Empfehlungen

für den Süden von Österreich

2025

Unsere Empfehlungen:

Unkrautbekämpfung im Mais:

> Zur Kulturvorbereitung vor der Saat:

- > **2,4 I Roundup® Future** in 200 l Wasser

> Voraufbau bis zum 3-Blattstadium des Mais:

- > **0,44 I Adengo®** ⇒ **terbuthylazinfrei 2,3 und 11,4 ha Packung**
 - > Geringer Anspruch an Bodenfeuchtigkeit
 - > Starke Boden- und Blattwirkung
 - > Stark gegen Problemunkräuter (z.B. Kamille) und Begrünungsreste
 - > Auf Standorten mit verminderter Wirkung von ALS-Hemmern auf Hühnerhirse empfehlen wir: 0,4 I Adengo® + 0,8 I Spectrum®

> Im Nachaufbau bis zum 6-Blattstadium des Mais:

- > **1,5 I Laudis® + 1,5 I Aspect® Pro** ⇒ **mit Terbuthylazin 3,3 und 6,6 ha Packung**
 - > Sulfonylharnstoff-freie Komplettlösung für beste Verträglichkeit bei jeder Witterung
 - > Extrem schnelle Blattwirkung - lange Bodenwirkung

Betriebe, die 2022 Terbuthylazin (z.B. Aspect Pro) letztmalig auf einer Maisfläche eingesetzt haben, können 2025 auf diesen Feldern wieder Laudis + Aspect Pro anwenden.

Vorteil:

Terbuthylazin ist stark gegen Knöterich-Arten, Ehrenpreis, Ambrosia, Storchschnabel u.a. mit Blatt- bzw. Bodenwirkung mit geringen Ansprüchen an die Bodenfeuchte.
- > **Laudis® Profi Plus (0,25 I Laudis® Profi + 1,5 I Mero® + 0,33 I Delion®)** ⇒ **terbuthylazinfrei 3 und 9 ha Packung**
 - > Jährlich einsetzbar
 - > Erstklassige Formulierung
 - > Das stärkste Laudis, das es je gab
 - > 3 Wirkungsmechanismen gegen Resistenzen
 - > Mit Bodenwirkung
 - > Gegen Ausfallgetreide bzw. Panicum-Hirschen ab 2 Blätter unter günstigen Bedingungen mit 0,6 l eines Nicosulfuron-Produktes (40g/l) oder 1,5 I Monsoon® mischen
- > **0,25 I Laudis® Profi Großbinde ideal für Großbetriebe oder Lohnspritzer** ⇒ **terbuthylazinfrei 12 ha Packung**
 - > Flexibles, Breitbandherbizid, immer in Mischung mit 1,5 I Mero verwenden
- > **Laudis® Monsoon® Plus (1,5 I Laudis® + 1,5 I Monsoon® + 0,4 - 0,6 I Delion®)** ⇒ **terbuthylazinfrei 3,3 ha Packung**
 - > Unschlagbar stark gegen Gräser, inklusive Panicumhirschen, Ausfallgetreide, Quecke, Johnsongras, uvm.
 - > Stark gegen Samen- und Wurzelunkräuter mit robuster Dicamba Dosierung

Alle Lösungen sind mit den terbuthylazinfreien Bodenherbiziden Spectrum® oder Successor® 600 mischbar und können in Tankmischung ab dem 2-Blattstadium eingesetzt werden.



Ungräserbekämpfung im Mais:

	Adengo Terbuthylazin-frei	Laudis + Aspect Pro	Laudis Monsoon Plus	MaisTer Power Terbuthylazin-frei	Laudis Profi Plus Terbuthylazin-frei
Hühnerhirse	+++	+++	+++	+++	+++
ALS-resistente Hühnerhirse	++(+) (evtl. + Spectrum)	+++	+++	-	+++
Gelbe Borstenhirse	+++	+++	+++	+++	+++
Glattblättrige und Gabelblütige Hirse optimal bis 2 Blätter	+++	+	+++	+++	++ (ab 2 Blätter + Nicosulfuron oder + Monsoon)
Wilde Kulturhirse (Rispenhirse)	+++	+++	+++	+++	+++
Fingerhirse optimal bis 3 Blätter	+++	+++	+++	+++	+++
Ausfallgetreide	+	+	+++	+++	+
Johnsongras 4-7 Blätter	+	+	+++ 2,2 - 2,5 l Monsoon	++(+)	+
Quecke 4-7 Blätter	+	+	+++ 2 l Monsoon	+++	+

Unkrautbekämpfung im Getreide im Frühjahr:

Zeitige Unkrautbekämpfung (ab 14 Tage nach Vegetationsbeginn) - idealerweise bei wüchsiger Witterung – erhöht den Ertrag

- **150 ml Sekator[®] OD in allen Getreidearten (außer Hafer)**
 - › Unerreicht im Preis-/Leistungsverhältnis
- **0,8 – 1 l Zypar[®] in allen Getreidearten (außer Hafer)**
 - › Einsetzbar bis voll entwickeltem Fahrenblatt
 - › Breite Wirkung gegen Unkräuter inkl. Kornblume, Storchschnabel und Distel

Windhalm- und Unkrautbekämpfung:

- **100 ml Husar[®] OD – Einfache Komplettlösung für alle Getreidearten (außer Hafer)**
 - › bei starkem Druck mit blühendem Ehrenpreis und Taubnessel + 0,4 kg Artist[®] (in Wintergerste) im 1 und 5 ha Gebinde verfügbar oder
- **200 ml Husar[®] Plus (nicht in Wintergerste und Hafer)**
 - › mit stärkerer Windhalm- und Flughafewirkung
- **0,8 kg Artist[®] + 120 ml Sekator[®] OD – die stärkste Lösung in der Wintergerste**
 - › inkl. blühenden Ehrenpreis und Taubnessel
- **0,65 l Sekator[®] Plus (= 150 ml Sekator[®] OD + 0,5 l Atlantis[®] OD) in Winterweizen, Roggen und Triticale**
 - › bei **Ackerfuchsschwanz** oder **Raygras** 1 l Atlantis[®] OD verwenden (nicht im Roggen)
- **0,8 l Zypar[®] + 0,5 l Atlantis[®] OD im Winterweizen, Roggen und Triticale**
 - › bei **Ackerfuchsschwanz** oder **Raygras** 1 l Atlantis[®] OD verwenden (nicht im Roggen)



Praxistipp:

Ackerfuchsschwanz oder Raygras 1 bis 2 Wochen nach Vegetationsbeginn bekämpfen!



Infektionsnahe Krankheitsbekämpfung in der **Gerste:**

> In Wintergerste

- > Spritzfolge für intensiv geführte Bestände
1 l Delaro® Forte im 1-Knotenstadium (im Tankmix mit Wuchsregler) bis Erscheinen des letzten Blattes gegen frühe Blattkrankheiten
1 l Ascra®_{xpro} + Folpan® 500 SC gegen alle Abreifekrankheiten zwischen Beginn bis Ende Ährenschieben
- > Einmalbehandlung **1,2 l Ascra®_{xpro} + Folpan® 500 SC** gegen alle Abreifekrankheiten bis zum Grannenspitzen



Infektionsnahe Krankheitsbekämpfung in **Weizen, Triticale oder Roggen:**

- > Intensiv-Spritzfolge für zeitige gebaute Bestände, krankheitsanfällige Sorten und frühem Befall mit **1 l Delaro® Forte** in Mischung mit Wuchsregler; **0,9 l Ascra®_{xpro}** im Fahnenblattstadium und **1 l Prosaro®** zur Weizenblüte (gegen Ährenfusariosen)
- > Spritzfolge mit **0,9 l Ascra®_{xpro}** gegen zeitige Blattkrankheiten gefolgt von **1,5 l Delaro® Forte** oder **1 l Prosaro®** infektionsnah zur Weizenblüte gegen Braunrost, Septoria und Ährenfusariosen
- > Einmalbehandlung beizeitigem Befall mit **1,2 l Ascra®_{xpro}** ab voll entwickeltem Fahnenblatt
- > Einmalbehandlung bei blattgesunden Sorten und spätem Befall mit **1,25 – 1,5 l Delaro® Forte** oder **1 l Prosaro®** ab dem Ährenschieben



Unkrautbekämpfung in der **Sojabohne:**

- > **2 kg Artist®** im Voraufbau, solange der Keimling mind. 1cm mit Erde bedeckt ist
 - > Saattiefe von 4 cm ist wichtig
 - > Breit wirksam inkl. Ambrosia
 - > Aktiver Beitrag zur Resistenzvorbeugung
 - > Sorteneinschränkungen beachten



Praxistipp: Wirkungskontrollen und eventuelle Korrekturspritzung im Nachaufbau



Sclerotinia- und Diaporthebekämpfung in der **Sojabohne:**

- > **1 l Propulse®**
 - > Ab Beginn der Blüte gegen Sclerotinia (bei Bodendurchfeuchtung)
 - > In Saatgutvermehrungen ab Mitte bis Ende der Blüte gegen Diaporthe/Phomopsis zur Verbesserung der Saatgutqualität



Mehltau- und Didymellabekämpfung im **Ölkürbis:**

- > **1 l Propulse® kurz vor Reihenschluss zu Blühbeginn**
 - > Vorbeugender Schutz gegen Mehltau und Didymella
 - > Gesunde Blätter und Triebe für eine lange Einlagerung in die Kerne
 - > Für mehr Ertrag und bessere Rentabilität

Unkrautbekämpfung in der Kartoffel:

- **2 l Bandur® + 0,75 l Sencor® Liquid** im VA vor dem Durchstoßen der Kartoffeln in Metribuzin-verträglichen Sorten
- **2 l Bandur® + 3 l Boxer®** im VA vor dem Durchstoßen in Metribuzin- unverträglichen Sorten und gegen Schwarzen Nachtschatten

Kartoffelkäfer- und Blattlausbekämpfung in der Kartoffel:

- **0,5 l Sivanto® Prime** gegen Kartoffelkäfer-Larven (L1 + L2 Stadium)
 - › bei etwas größeren Larvenstadien **75 ml Decis® Forte** beimischen
 - › 2. Spritzung mit 60 ml Coragen®

Krankheitsbekämpfung in der Kartoffel:

Spritzfolge Phytophthora	Infinito 1,5 l/ha		Infinito 1,5 l/ha	Voyager 1 l/ha	Reboot 0,45 kg/ha	Winner	
	Evt. Kontakt- fungizid		Propulse 0,5 l/ha	Wirkstoff- wechsel	Propulse 0,5 l/ha		
Spritzintervall 10-12 Tage							
	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79	80 – 89	91 – 93
							95 – 97

Stoppspritzung:

Infinito + Winner (sporenabtötendes Kontaktmittel) Wenn wieder Regen fällt:
3-5 Tage erneute Behandlung mit Reboot + sporenabtötendes Kontaktmittel

Aktuelle Meldungen, Videos und Vortragstermine Ihres Beraters, abgestimmt auf Kultur und Region, finden Sie jetzt unter: agr.ar.bayer.at/meineberatung Oder einfach QR-Code scannen.



Weitere Details zu diesen Kurzeempfehlungen entnehmen Sie bitte dem Feldbauratgeber 2025.




Beratungsdienst:

01/711 46-2835

cropscience.austria@bayer.com

www.agrar.bayer.at

Viel Erfolg in der Saison 2025 mit innovativen Produkten von Bayer wünschen



Dominik Schober
0664/2246370



Benjamin Fleck
0664/88134129

Pfl.Reg.Nr.: Adengo 3063-0, Artist 2913-0, Ascra Xpro 3866-0, Aspect Pro 2947-0, Atlantis OD 3253-0, Bandur 2579-0, Decis Forte 3554, Delaro Forte 4332, Delion Pfl.Reg.Nr. 4216-901, Husar OD 3019-0, Husar Plus 3566-0, Infinito 3111-0, Laudis 2912-0, Laudis Profi 3683-0, MaisTer Power 3271-0, Monsoon 2826-0, Prosaro 3054-0, Propulse 3371-0, Reboot 3640-0, Roundup Future 4471-0, Sekator OD 3372-0, Sencor Liquid 3381-0, Sivanto Prime 4091-0, Zypar 3883-0

eWz. der BASF Alverde 2911-0, eWz. der Syngenta Boxer 2525-0, eWz. der FMC Coragen 2984-0, eWz. der Adama Folpan 500 SC 2855-0, eWz. der BASF, Spectrum 2798-0, eWz. der PyTech Chemicals Successor 600 2881-0; eWz. der Certis Belchim Voyager 4111-0, eWz. der Kwizda Winner 2528-0

Stand: Oktober 2024 Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

® = eWz. der Bayer Gruppe, bzw. des jeweiligen Herstellers.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Aufwandmengen pro Hektar.

Drucker: Print Alliance HAV Produktions GmbH in Österreich

