Regional-Empfehlungen 2027

für den Süden von Österreich

Unkrautbekämpfung im **Mais**:

Zur Kulturvorbereitung vor der Saat:

- ***2,4 l Roundup® Future*** in 150-200 l Wasser

Vorauflauf bis zum 3-Blattstadium des Maises:

- ***0,4 l Adengo®*** ➡ ***terbuthylazinfrei***
  2,5 und 12,5 ha Packung
  - Geringer Anspruch an Bodenfeuchtigkeit
  - Starke Boden- und Blattwirkung
  - Stark gegen Problemunkräuter (z.B. Kamille) und Begrünungsreste
  - Auf Standorten mit verminderter Wirkung von ALS-Hemmern auf Hühnerhirse empfehlen wir: 0,4 l Adengo® + 0,8 l Spectrum®

Im Nachauflauf bis zum 6-Blattstadium des Maises:

- ***1,5 l Laudis® + 1,5 l Aspect® Neo*** ➡ ***mit Terbuthylazin***
  3,3 und 6,6 ha Packung
  - Sulfonylharnstoff-freie Komplettlösung für beste Verträglichkeit bei jeder Witterung
  - Extrem schnelle Blattwirkung - lange Bodenwirkung

  Vorteil:
  Terbuthylazin ist stark gegen Knöterich-Arten, Ehrenpreis, Ambrosia, Storchschnabel u.a. mit Blatt-bzw. Bodenwirkung mit geringen Ansprüchen an die Bodenfeuchte.

- ***Laudis® Profi Plus (0,25 l Laudis® Profi + 1,5 l Mero® + 0,33 l Delion®)*** ➡ ***terbuthylazinfrei***
  3 und 9 ha Packung
  - Erstklassige Formulierung
  - Das stärkste Laudis, das es je gab - gegen Standard- und Wurzelunkräuter inkl. Begrünungsreste
  - 3 verschiedene Wirkmechanismen für ein perfektes Resistenzmanagement
  - Mit Bodenwirkung gegen eine Hirse- und Unkrautwelle

  Tipp:
  - Gegen Ausfallgetreide bzw. Panicum-Hirsen: + 1,5 l Monsoon® oder 0,6 l eines Nicosulfuron-Produktes (40g/l)
  - Zur Verlängerung der **Bodenwirkung bei starkem Hirsedruck + 0,8 l Spectrum*****

- ***Laudis® Monsoon® Plus (1,5 l Laudis® + 1,5 l Monsoon® + 0,4 - 0,6 l Delion®)*** ➡ ***terbuthylazinfrei***
  3,3 ha Packung
  - Unschlagbar stark gegen Gräser, inklusive Panicumhirsen, Ausfallgetreide, Quecke, Johnsongras, uvm.
  - Stark gegen Samen- und Wurzelunkräuter mit robuster Dicamba Dosierung
  - Wenn eine Bodenwirkung gewünscht wird: + 1 l Spectrum***

****Alternativ können auch die entsprechenden Aufwandmengen von Spectrum® Gold, Successor® 600 oder Successor® Tx verwendet werden.*

Adengo | Laudis Profi Plus | Delaro Forte | Husar Plus | Propulse

BAYER

Ungräserbekämpfung im **Mais**:

	Adengo Terbuthylazin-frei	**Laudis + Aspect Neo**	**Laudis Monsoon Plus** Terbuthylazin-frei	**MaisTer Power Plus** Terbuthylazin-frei	**Laudis Profi Plus** Terbuthylazin-frei
Hühnerhirse	+++	+++	+++	**+++**	+++
ALS-resistente Hühnerhirse	++(+) (evtl. + Spectrum)	+++	+++	-	+++
Gelbe Borstenhirse	+++	+++	+++	+++	+++
Glattblättrige und Gabelblütige Hirse optimal bis 2 Blätter	+++	+	+++	+++	++ (ab 2 Blätter + Nicosulfuron oder + Monsoon)
Wilde Kulturhirse (Rispenhirse)	+++	+++	+++	+++	+++
Fingerhirse optimal bis 3 Blätter	+++	+++	+++	+++	+++
Ausfallgetreide	**+**	**+**	+++	**+++**	**+**
Johnsongras 4-7 Blätter	+	+	+++ 2,2 - 2,5 l Monsoon	++(+)	+
Quecke 4-7 Blätter	+	+	+++ 2 l Monsoon	+++	+

Unkrautbekämpfung im **Getreide** *im Frühjahr:*

Zeitige Unkrautbekämpfung (ab 14 Tagen nach Vegetationsbeginn) - idealerweise bei wüchsiger Witterung – erhöht den Ertrag

- ***150 ml Sekator® OD in allen Getreidearten (außer Hafer)***
  - Unerreicht im Preis-/Leistungsverhältnis
- ***0,8 – 1 l Zypar® in allen Getreidearten (außer Hafer)***
  - Einsetzbar bis voll entwickeltem Fahnenblatt
  - Breite Wirkung gegen Unkräuter inkl. Kornblume, Storchschnabel und Distel

Windhalm- und Unkrautbekämpfung:

- ***100 ml Husar® OD*** – *Einfache Komplettlösung für alle Getreidearten (außer Hafer)*
- ***200 ml Husar® Plus*** *(nicht in Wintergerste und Hafer)*
  - mit stärkerer Windhalm- und Flughaferwirkung
- ***0,65 l Sekator® Plus*** (= 150 ml Sekator OD + 0,5 l Atlantis OD) in Winterweizen, Roggen und Triticale
  - bei ***Ackerfuchsschwanz*** oder ***Raygras*** 1 l Atlantis® OD verwenden (nicht im Roggen)

Praxistipp:

Ackerfuchsschwanz oder Raygras 1 bis 2 Wochen nach Vegetationsbeginn bekämpfen!

Infektionsnahe Krankheitsbekämpfung in der **Wintergerste**:

Einmalbehandlung


Für besten Schutz und hohen Ertrag (inkl. Halmbruch)

**Optimal in Tankmischung mit Wuchsregler im 1- Knotenstadium*

Delaro® Forte* 1,1 l

Ascra® XPRO + Folpan® 500 SC 1 l + 1,5 l

Ascra® XPRO + Folpan® 500 SC 1,2 l + 1,5 l



31 37 39 49 51 59 61 69

Infektionsnahe Krankheitsbekämpfung in **Weizen, Triticale oder Roggen**:

Gegen alle Blatt- und Ährenkrankheiten

***gegen Ährenfusariosen*

Intensivstrategie bei zeitigem Krankheitsbefall, anfälligen Sorten, gegen alle Halm-, Blatt- und Ährenkrankheiten

****Optimal in Tankmischung mit Wuchsregler im 1- Knotenstadium*

Delaro® Forte 1,25 l ***

Ascra® XPRO 1 l

Ascra® XPRO 1 l

Delaro® Forte 1,25 l + 1,5 l **

Prosaro® 1 l



31 37 39 49 51 59 61 69

Schädlingsbekämpfung im **Getreide**:

- ***75 ml Decis® Forte*** gegen Getreidehähnchen (Blattläuse werden miterfasst)

Sklerotinia- und Diaporthebekämpfung in der **Sojabohne**:

- ***1 l Propulse®***
  - Ab Beginn der Blüte gegen Sklerotinia (bei Bodendurchfeuchtung)
  - Gesunde Stängel ohne Pilzbefall für eine volle Kornfüllung
  - In Saatgutvermehrungen zur Verbesserung der Saatgutqualität

Mehltau- und Didymellabekämpfung im **Ölkürbis**:

- ***1 l Propulse® kurz vor Reihenschluss zu Blühbeginn***
  - Vorbeugender Schutz gegen Mehltau und Didymella
  - Gesunde Blätter und Triebe für eine lange Einlagerung in die Kerne
  - Für mehr Ertrag und bessere Rentabilität

Unkrautbekämpfung in der **Kartoffel**:

- ***2 l Bandur® + 3 l Boxer®*** im VA vor dem Durchstoßen der Kartoffeln
- ***+ 0,2 l Centium® CS*** bei Stechapfel und Windenknöterich
  - Im VA mind. 5 Tage vor dem Durchstoßen der Kartoffeln anwenden




Kartoffelkäfer- und Blattlausbekämpfung in der **Kartoffel**:

- ***0,5 l Sivanto® Prime*** gegen Kartoffelkäfer-Larven (L1 + L2 Stadium)
  - bei etwas größeren Larvenstadien ***75 ml Decis® Forte*** beimischen
  - 2. Spritzung mit 60 ml Coragen®



Krankheitsbekämpfung in der **Kartoffel**:




Stoppspritzung:
Infinito + Winner (sporenabtötendes Kontaktmittel). Wenn wieder Regen fällt:
Nach 3-5 Tagen erneute Behandlung mit Reboot + sporenabtötendes Kontaktmittel
*1 ab BBCH 40 zugelassen
*2 +40gr Amisulbrom für vorbeugendes Resistenzmanagement

Aktuelle Meldungen, Videos und Vortragstermine Ihres Beraters, abgestimmt auf Kultur und Region, finden Sie jetzt unter: agrar.bayer.at/meineberatung Oder einfach QR-Code scannen.

Weitere Details zu diesen Kurzempfehlungen entnehmen Sie bitte dem Feldbauratgeber 2027.

Beratungsdienst:
01/711 46-2835
cropscience.austria@bayer.com
www.agrar.bayer.at

Viel Erfolg in der Saison 2027 **mit innovativen Produkten von Bayer wünschen**



Dominik Schober
0664/2246370



Benjamin Fleck
0664/88134129

eWz. der Bayer Gruppe Pfl.Reg.Nr.: Adengo 3063-0, Ascra XPRO 3866-0, Aspect Neo 3461-901, Atlantis OD 3253-0, Bandur 2579-0, Decis Forte 3554, Delaro Forte 4332, Delion Pfl.Reg.Nr. 4216-901, Husar OD 3019-0, Husar Plus 3566-0, Infinito 3111-0, Laudis 2912-0, Laudis Profi 3683-0, MaisTer Power 3271-0, Monsoon 2826-0, Prosaro 3054-0, Propulse 3371-0, Reboot 3640-0, Roundup Future 4471-0, Sekator OD 3372-0, Sivanto Prime 4091-0

eWz. der Syngenta Boxer 2525-0, eWz. der FMC Coragen 2984-0, eWz. der Adama Folpan 500 SC 2855-0, eW.z der BASF Spectrum 2798-0, Spectrum Gold 3461-0, eWz. BASF Österreich GmbH Revyona 4287-0, Signum 3199-0, eWz. der PyTech Chemicals Successor 600 2881-0, Successor Tx 3777-0, eWz. der Certis Belchim Narita 3523-0, Voyager 4111-0, eWz. der Kwizda Winner 2528, eWz. Corteva Zorvec Entecta 4403-0, Zypar 3883-0

Stand: Oktober 2026. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
® = e.Wz. der Bayer Gruppe, bzw. des jeweiligen Herstellers.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Aufwandmengen pro Hektar.
Drucker: Print Alliance HAV Produktions GmbH in 2540 Bad Vöslau